

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsatname Tarih ve No. : 10911 / 12.06.2017



KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLI YABANCI OTLAR:

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Soğan	Adana Pancarı (<i>Beta adanensis</i>) Adi Yavşan Otu (<i>Veronica hederifolia</i>) Çatalotu (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Çobanedeğneği (<i>Polygonum aviculare</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Farekulağı (<i>Anagallis arvensis</i>) Kırmızı Köklü Tilikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Kısır Yabancı Yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Şeytan Elması (<i>Datura stramonium</i>) Tilikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Yapışkan Ot (<i>Setaria verticillata</i>)	300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi
Pamuk	Benekli Darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Çatalotu (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Hanım Döşegi (<i>Euphorbia prostrata</i>) Hint Keneviri (<i>Corchorus olitorius</i>) Kırmızı Köklü Tilikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Köpek Üzümlü (<i>Solanum nigrum</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Şeytan Elması (<i>Datura stramonium</i>) Yapışkan Ot (<i>Setaria verticillata</i>) Yeşil Horozibigi (<i>Amaranthus viridis</i>)	300 ml/da Ekim öncesi
Mısır	Benekli Darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Dikenli Eşek Marulu (<i>Sonchus asper</i>) Kırmızı Köklü Tilikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Yapışkan Ot (<i>Setaria verticillata</i>)	300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI:

KALİBRASYON: Uygulama öncesi makinanın kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için makinanın deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır

PARADE 450 CS

KAPSÜL SÜSPANSİYON (CS)

Grubu	K1	Herbisit (Yabancı Ot İlacı)
-------	----	--------------------------------

450 g/l Pendimethalin

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/4'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114



SUNO

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Net miktarı : 1 Litre
Azami perakende satış fiyatı :

İÇİNDEKİLER:
Pendimethalin

ZARARLILIK İŞARETİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADESİ:
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:
P391 Döküntüleri toplayın
P280 Korumaya eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH208 Pendimethalin içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

İHRACATÇI FİRMA:
Jadesheen Chemical Co., Ltd.,
901, NO. 299, Tongdu road, Jiangyin (214400), PR.Çin

İMALATÇI FİRMA:
Rosi Chemical Co., Ltd.,
No.146 Ningkang West Road, Yueqing, Zhejiang Çin

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:
Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adalet Mah. Manas Bly. No:39 Folkart Towers B Kule Kat.31
D:3107AF Bayraklı-Izmir- Türkiye
Tel: 02323909205 Fax: 02323909101

UYGULAMAYA HAZIRLAMA:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü ve yayıcı yapıstırıcı önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Soğan: Parade 450 CS iyi hazırlanmış keseklerden, yabancıotlardan ve daha önce ekilmiş bitkilerin artıklarından temizlenmiş olan toprağa soğan ekiminden sonra çıkış öncesi uygulanır.

Pamuk: Parade 450 CS ekim öncesinde tarla pülverizatörüyle uygulanır. Uygulamadan sonra hemen veya en geç 4 gün içinde disk, rototiller veya tırmık ile toprağa 5-8 cm derinliğinde karıştırılmalıdır. Bu süre içerisinde 10 mm yağış düşerse, toprağa karıştırmaya gerek yoktur.

Mısır: Parade 450 CS Ekimden hemen sonra yabancıotlar çıkış yapmadan (çıkış öncesi) uygulanmalıdır.

Kurak şartlarda PARADE 450 CS uygulamasını takip eden 3-7 gün içerisinde 5-10 mm sulama yapılmalıdır.

ÜRÜN MÜNAVEBESİ:

Hemen ekilebilecek bitkiler; Pamuk, fasulye, bezelye, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği ve şaşırtılan bitkiler. 6 ay sonra diğer bitkiler ekilebilir. Uygulama yapılmış tarlaların herhangi bir nedenle bozulması halinde, Toprak 15 cm işlenerek: Buğday, arpa, pamuk, patates, fasulye, soya ve bezelye, Toprak işlenmeden: Mısır, fasulye ve bezelye ekilebilir.

FİTOTOKSİTE:

Parade 450 CS hastalık, kuraklık, aşırı rutubet, derin ekim, topraktaki pH oranının yüksek veya düşük olması, yüksek tuz oranı gibi nedenlerden zayıf ve stresli durumda olan bitkilerde fitotoksiste yapabilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Parade 450 CS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup K1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Parade 450 CS'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup K1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

PARADE 450 CS

KAPSÜL SÜSPANSİYON (CS)

Grubu	K1	Herbisit (Yabancı Ot İlacı)
-------	----	--------------------------------

450 g/l Pendimethalin

ZEHRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik, göz ve ciltte tahriş.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Solunması halinde: Kazazedeyi hemen temiz havaya çıkarın ve dinlendirin. Solunum durmuşsa, suni solunum uygulayın. Tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde: Hemen tıbbi yardım alın. İlaç etiket ve ambalajını doktora gösteriniz. Kusturmaya çalışmayın. Ağzı suyla iyice çalkalayın.

Ciltle teması halinde: derhal bol su ve sabun ile iyice yıkayın. Tahriş oluşursa, tıbbi yardım alın.

Göze teması halinde: Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice aralayarak en az 15 dakika bol su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHRİ DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114



SUNO

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

• Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.

• Uygulamadan sonra makinaı temizleyiniz.

• Tohum yatağı iyi hazırlanmalı, toprak ince ve keseksiz olmalıdır.

• Tavsiye edilen ekim derinliklerine titizlikle uyulmalıdır.

• Bitki koruma ürününden en iyi sonucu alabilmek için toprak rutubeti şarttır.

• % 10 dan fazla organik madde içeren topraklarda ot kontrolünde azalma olabilir. Kumlu topraklarda kullanılmamalıdır.

• Uygulama düzgün yapılmamışsa yabancı ot kontrolünü azaltır veya bitkiye zarar verir.

• Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

• Su göllenen yerlerde kullanılmamalıdır.

• Doğal su kaynaklarına bulaştırmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekilde, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.