

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No. :

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

BİTKİ ADI	Yabancı Otlar	Uygulama Dozu
Buğday, Arpa	Arap Baklası (<i>Vaccaria pyramidata</i>) Ballıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>) Tarla Dügün Çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>) Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>) Gönül Hardalı (<i>Myagrum perfoliatum</i>) Kokarot (<i>Bifora radians</i>) Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>) Sarı Öt (<i>Boreava orientalis</i>) Yabani Cıvıt Otu (<i>Isatis tinctoria</i>) Adı Fig /Yabani Fig (<i>Vicia sativa</i>) Yabani Turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Yabani Hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Boynuzlu Yoğurt Otu (<i>Galium tricornutum</i>) Tarla Yapışkan Otu (<i>Asperula arvensis</i>) Topluğne Hardalı (<i>Neslia paniculata</i>) Taşkesen Otu (<i>Buglossoides arvensis</i>) Yapışkan Nakıl (<i>Silene conoidea</i>) Yumrulu Jeranyum (<i>Geranium tuberosum</i>)	1 g/da
Buğday, Arpa	Peygamber Çiçeği / Gökbaş (<i>Centaurea depressa</i>)	1,5 g/da veya 1g+ %0.2 yayıcı yapıştırıcı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

KALİBRASYON:

Uygulama öncesi makinenin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için makinenin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

UYGULAMAYA HAZIRLAMA:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç (ve eklenecekse yayıcı yapıştırıcı) ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinasının deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli mme kullanılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

SUNABERON 75 WG

SUDA DAĞILILABİLİR GRANÜL (WG)

Grubu	2	Herbisit (Yabancı Ot İlacı)
-------	---	--------------------------------

%75 Tribenuron Methyl

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Gözde hafif iritasyon yapabilir. Herhangi bir klinik zehirlenme olayına rastlanmamıştır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114



SUNO

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Net miktarı :
Azami perakende satış fiyatı :

İÇİNDEKİLER:

Tribenuron Methyl

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADESİ:

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P391 Döküntüleri toplayın.

P280 Korumucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P501 İçeriği/kabı bertaraf edin.

EUH 401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

İHRACATÇI FİRMA:

Jadesheen Chemical Co., Ltd.,
901, NO. 299, Tongdu road, Jiangyin (214400), P.R.China

İMALATÇI FİRMA:

Jiangsu Repont Pesticide Factory Co., Ltd.,
Yangkou Chemical Park, Rudong County, Nantong City,
Jiangsu Province, P.R.China

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adalet Mah. Manas Bld. No:39 Folkart Towers B Kule Kat.31
D:3107AF Bayraklı-Izmir Türkiye
Tel: 02323909205 Fax: 02323909101

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

*Üründe bir zarar ortaya çıkabileceğinden SUNABERON 75 WG'i anormal hava şartları ve kuraklık nedeniyle baskıya veya zararlılar tarafından hasara uğratılmış bitkilere tatbik emeyiniz.

Hububatın 2 yapraklı devresinden kın devresine (Başak kın içerisinde) kadar olan dönem içinde güvenle kullanılabilir. SUNABERON 75 WG tatbikat zamanı açısından büyük esneklik sağladığından, uygulama zamanı, problem olan yabancı otların büyüme devrelerine göre tespit edilir. En iyi netice tatbikat, yabancı otlar en az 2 yapraklı devrede iken ancak 15 cm yükseklik veya çapa ulaşmadan ve yabancı otların üstü hububat tarafından kapatılmadan yapıldığında alınır. Gökbaş otunun çok olduğu tarlalarda ilaçlama Gökbaş'ın 7-8 yapraklı ve 8-9 cm çapa ulaştığı rozet döneminde yapılmalıdır.

SUNABERON 75 WG kökler ve yeşil aksam yoluyla yabancı otlar tarafından bünyelerine alınır. Topraktaki kalıcı etkisi kısadır. Hassas yabancı otların büyümesi tatbikattan kısa süre sonra durur. Ancak ölüm belirtileri büyüme şartlarına, yabancı otların hassasiyetlerine bağlı olarak tatbikattan 1-3 hafta sonra görülür. Tatbikattan sonra 2 saatlik yağışsız süre yabancı ot kontrolünün en yüksek seviyede olması açısından önemlidir. Tatbikattan sonraki sıcak ve nemli şartlar SUNABERON 75 WG'nin etkisini hızlandırırken, soğuk ve kuru şartlar bunu geciktirir. SUNABERON 75 WG uçucu ve yanıcı değildir. İlaçlama aletlerini aşındırmaz. SUNABERON 75 WG buğday ve arpada geniş yapraklı yabancı ot mücadelesinde kullanılan etki alanı geniş bir yabancı ot ilacıdır. Düşük dozlarda kullanılır, seçiciliği çok yüksektir.

ÜRÜN MÜNAVEBESİ:

Buğday ve arpadaki SUNABERON 75 WG kullanımından sonra normal ekim münavebesine giren her kültür bitkisi ekilebilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

SUNABERON 75 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SUNABERON 75 WG' in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 2 hariçi) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILABİLİRLİK:

Genel olarak bütün dozlarda yayıcı yapıştırıcı kullanılabilir. Bu SUNABERON 75 WG'in bazı yabancı otlar üzerindeki etkisini artırabileceği gibi etkinin daha çabuk odaya çıkmasına da neden olacaktır. SUNABERON 75 WG 2,4-D Ester ve Amin terkipli ilaçlarla karıştırılıp kullanılabilir.

SUNABERON 75 WG

SUDA DAĞILILABİLİR GRANÜL (WG)

Grubu	2	Herbisit (Yabancı Ot İlacı)
-------	---	--------------------------------

%75 Tribenuron Methyl

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Yutma: Yutulması durumunda zehir danışma merkezi veya doktora başvurunuz. Zehir danışma merkezi veya doktor tarafından söylenmedikçe kusturmaya çalışmayınız. Bilinci kapalı kişiye ağızdan bir şey vermeyiniz.

Göz: Temas halinde derhal bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Varsa kontakt lensleri 5 dk sonra çıkarıp yıkamaya devam edin. Zehir danışma merkezi veya doktora başvurunuz.

Cilt: Temas halinde kirli giysi ve ayakkabıları çıkarın. Bol su ile 15-20 dakika yıkayın. Semptomlar devam ederse doktora danışın.

Soluma: Temiz havaya çıkarın. Nefes almıyorsa ambulans çağırın ve suni teneffüs yapın. Zehir danışma merkezi veya doktora başvurunuz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114



SUNO

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bahçalara zehirlidir, Sulara bulaştırmayınız.
- Depolama ve atık imhası sırasında sulara, gıda maddelerine ve yemlere bulaştırmayınız.
- Gübre, insektisit ve tohumlardan ayrı yerlerde depolayınız.
- İlacı özel ambalajında kapalı olarak, serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.
- Boş ilaç ambalajlarını başka gaye için kullanmayınız, usulüne göre imha ediniz.
- Meyve ağaçları veya tavsiye edilmediği diğer kültür bitkilerinin köklerinin bulunabileceği veya ilacın taşınarak yada yıkanarak ulaşabileceği sahalara tatbik etmeyiniz.
- İlaçlama sırasında ilacın tavsiye edilmediği kültür bitkilerine bulaşmasına mani olunuz. Akarsu ve sulama sularına bulaştırmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında ve orijinal ambalajında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik **FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.