

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Sarı No:
Ruhsat Tarih ve No. : 10945 - 08.08.2017



KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

BİTKİ ADI	Zararlı Organizma Adı	Dozu
	TEK YILLIK DAR VE GENİŞ YAPRAKLI YABANCI OTLAR Yabancı yulaf (<i>Avena fatua</i>) Yabancı havuç (<i>Daucus carota</i>) Ksar Brom (<i>Bromus sterilis</i>) Kuş Yemi (<i>Phalaris spp.</i>) Gimsel Mardümik (<i>Lathyrus nissolia</i>) Baltibaba (<i>Lamium amplexicaule</i>) Kanarya Otu (<i>Senecio vernalis</i>) Tilli Kuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Yer Fesleğeni (<i>Mercurialis annua</i>) Çalınaya Hurdalı (<i>Ochrodium segetiacum</i>) Düğün Çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>) Turna Gagası (<i>Geranium tuberosum</i>) Yabancı Fığ (<i>Vicia hybrida</i>) Kuş Otu (<i>Stellaria media</i>) Yabancı Hurdalı (<i>Sinapis arvensis</i>) Ebegümeci (<i>Malva spp.</i>) Yabancı Yonca (<i>Medicago polymorpha</i>) Sembizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Silleğen (<i>Euphorbia spp.</i>) Sirkem (<i>Chenopodium album</i>) Bambıl Otu (<i>Chrozochloa trichotica</i>) Domuz Pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) Zincir Pıtrağı (<i>Xanthium spinosum</i>) Kırmızı Köklü Tili Kuyruğu (<i>Amaranthus retrofractus</i>) Yeşil Kırıl Dan (<i>Sisotia urticae</i>) Dancan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Benekli Dancan (<i>Echinochloa colonum</i>) Horaz İbği (<i>Amaranthus albus</i>) Yeşil Horaz İbği (<i>Amaranthus viridis</i>)	300ml/da
Turungçiller, Bağ*, Fındık, Meyve Bahçecileri ve Eski olmayan Alanlar		
	ÇOK YILLIK YABANCI OTLAR (Hububat ekili alanlarda hasattan sonra yeniden sürümüş kamış vb. çok yıllık yabancı otlara) Topalak (<i>Cyperus rotundus</i>) Kökpek Diş Aynığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Tarla Benekli (<i>Convolvulus arvensis</i>) Isrgan Otu (<i>Urtica urens</i>) Pelin Otu (<i>Artemisia vulgaris</i>) Kanyas (<i>Gallip</i>) (<i>Sorghum halepense</i>)	600 ml/da
Kara, demiryolu kenarları, Havacalanlar, Fabrika bahçecileri, Tarihi alanlar, Tarla kenarları		
	Çalısma ve odunsu bitkilere karşı	1000 ml/da
Banketler, Su ve drenaj kanalları	Banket ve su üstü yabancı otlar	1000-1500 ml/da

*Tükeltim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMA VE KULLANIM ŞEKLİ:

Tavsiye edilen dozdağı ilaç miktarı püverizatörün deposuna konur, su ile iyice karıştırılarak doğrudan yabancı otlara püverize edilir. En iyi sonuç yabancı otların aktif olarak büyüldüğü zamanlarda elde edilir. İlaç mahallin kültür bitkilerinin yeşil ağsına ve genç fidelerine henüz oluşmuşmuş yeşil kabuğuna püverize edilmemesine dikkat edilmelidir. Sistemik etkili bir ilaç olduğundan, ilacı odara müfiz edilebilmesi için ilaçlanmadan sonra en az 4-5 gün geçmeden yabancı otları zedeleyecek toprak işlemesi yapılmamalıdır. Dekarı uygulamak ideal su miktarı 20-40 litre/da. Uygulamalarda, ilacın yeşil yaprakla bitirmeli memeler kullanılarak ve ilaçlama aletini değişik basınçla çalıştırarak bu amaçla olası. Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapılmamalı.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

İlaçlanmanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkayın. Yıkama işlemi su kaynaklarını bozmadan yapınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

TORPADE 480 SL (Glyphosate Isopropylamin Tuzu) adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasında göre G grubu olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasında sahip bitki koruma ürünlerinin tekrardan uygulanması, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TORPADE 480 SL'ni üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısı asmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasında sahip (G grubu hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:

Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmaz.

TORPADE 480 SL

SOLÜSYON KONSANTRE (SL)

Grubu	G	Herbisit (Yabancı Ot İlacı)
-------	---	--------------------------------

480 g/l Glyphosate Isopropylamin Tuzu

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. EVDE KULLANMAYINIZ. ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SİRASINDA HIÇ BİR ŞEY İÇMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN INSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ. İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DİŞİNDA KULLANILMASI KEŞİNLİKE YASAKTIR

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/4'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, halsizlik vs

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz ile temas:

Ürün gözler için ciddi tahriş edicidir. Toksikite çalısma alanındaki gibi ağrı, salınma ve kızamık gibi rahatsızlığa neden olabilir.

Deri ile temas:

Toksikite çalısma alanına göre uzun hafif tahriş edicidir.

Yutma:

Bir ağır dolusundan az küçük miktarlarda yutulması durumunda ağızdan bir ters etki gelişimi beklenmez. Ürünün benzer formülasyonunda diğer ürünlerin yutulmaları durumunda ağızdan tahriş meydana sındırım yolu rahatsızlığı, ağır karınlığı, mide bulantısı, kusma ve ishal rapor edilmistir. Yine benzer formülasyondağı başka ürünlerin büyük miktarlarda yutulmaları sonucunda akciğerlerde ödem ve hipertansiyon bildirilmiştir. Ürünün kendisine ait ve ya da çok miktarlarda yutulması durumunda etkilere ait bildirim yoktur ancak zararlı olarak sınıflandırılmıdır.

Solumun:

Klinik toksiste çalısma alanına göre üst solunum yollarını hafif tahriş eder. Toz ve buharların solunmak zararlıdır.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114



SUNO

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Net miktarı : 1 litre

Azami perakende satış fiyatı :

İÇİNDEKİLER:

- Glyphosate
- Glyphosate isopropylamin tuzu

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H411 Sıcak ortama uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P103 Kullanmadan önce etiket okuyun.

P273 Çevreye verilmemesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kuyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanın.

P301 Dehşentileri toplayın.

P501 İçerdiği kabu bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılar, kuşlar ve balıklar zehirlir.
- Tüm herbisit olduğundan tüm kültür bitkilerine fitotoksiktir.
- İlacın hazırlanmasında embo ve galvanizli metal kaplar kullanılmaz.
- Dondan koruyunuz, serin ve rutubetsiz depolarda saklayınız.
- Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapılmamalıdır.
- İlaçlama yapılacak yerdeki ağaçların gövdeden çıkan pıçları, ilaçlanmadan iki hafta önce veya ilaçlanmadan hemen sonra kesilmelidir.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacı itfalsiz, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde boğsuna (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orjinal ambalajında satılmış kayıtlı imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarını hatalı depolanması veya tavsiyeleri uymadığı elverişsizliklerinde boğsuna zarar için sorumluluk kabul etmezler.

İMALATÇI FİRMA:

Jadesheen Chemical Co., Ltd., 901, NO. 299, Tongdu road, Jiangyin, PR.Chn

FABRİKA:

Jiangxi Jinlong Chemical Co., Ltd., Tashan Industrial Park of Leping City of Jiangxi Province, Çin

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Adalet Mah. Manas Bly:No:39 Folkart Towers B Kule Kat:31 D:3107AF Bayındır-İzmir Türkiye Tel: 02323909205 Fax: 02323909101