

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No. : 19.01.2018/ 11036



KULLANILANACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

BİTKİ ADI	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arası Süre
Bağ *	Bağ Salımlı Güvesi (Lobesia botrana)	25 ml / 100 L su Larva	3 gün (potaslık üzüm) 7 gün (saraplık üzüm)
Pamuk	Yerilkarı (Helicoverpa armigera)	45 ml/da Larva	14 gün
	Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)	40 ml/da Larva	14 gün
Elma	Elma içkuru (Cydia pomonella)	35 ml/100 L su Yumurta - Larva	14 gün
Fındık	Fındık kurdu (Curculio nucum)	45 ml/da Ergin	14 gün
Damates	Yerilkarı (Helicoverpa armigera)	40 ml/da Larva	3 gün
Damates (Sera)	Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)	35 ml/100 L su Larva	3 gün
Mısır	Mısır kaçan kurdu (Sesamia spp.)	30 ml/da Larva	3 gün
	Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis)	30 ml/da Larva	3 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI:

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlanacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMAYA HAZIRLAMA:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken BKÜ su karışımı depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlandıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmaktadır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulanmış tamamlanmışından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve artıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

SUNIDOX 150 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

Grubu

22A

İnsektisit
(Böcek İlacı)

150 g/l Indoxacarb

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HiÇ BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ. İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKLİDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR
KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/4'ÜNE KADAR TEMİZ SU
KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA
BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114



Sono Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Net miktarı : 100 Ml
Azami perakende satış fiyatı :
İÇİNDEKİLER:
Indoxacarb ve yardımcı maddeler içerir.
ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İBARELERİ:

H301 Yutulması halinde toksiktir.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
H371 Organlarda hasara yol açabilir (Sinir sistemi)
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H410 Susul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P264 Elbeğlemeden sonra su ile iyice yıkayın.
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ylüz koruyucu kullanın.
P301+P312 YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimini arayın.
P331 Kusurmayın.
P370+P378 Yangın durumunda: Söndürme için kuru kum, kuru kimyasal ve alkole dayanıklı köpük kullanın.
P403 İyi havalandırılan yerde depolayın.
P405 Kilit altında saklayın.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.
P501 İçeriği/kabı bertaraf edin.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Boğ salım güvesine karşı salım güvesi uygulama zamanları tahmini-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tozraklarda yakulanan kelebek sayısı tope noktasına ulaşmış, düşmeye başlamış, etkilili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derce, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 150C ve tinerinde olmak, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkilili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derce, 3. dölde 1047 gün-derceye ulaşmış, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koralı, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde ilaçlamaya karar verilir. Her dölde bir ilaçlama yapılır.

Pomukta pamuk yapraklıkurduna karşı 10-15. adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kolları kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Pomukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurta yumurta ve larvaları sayılır ve 3m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Mısır kurdı ve Mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamaya tahminen 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlaların büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sep, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i buluşuk bulunmuş ise uygulama yapılır.

Domateste pamuk yapraklıkurduna karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sorm daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Elma içkurdı: Elma içkurdı'na yapışıcak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdı mücadelesinde baskı, her dölde ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmekten önce öldürmekle olur.

Fındık kurduna karşı meyveciğin mericimcik triliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2'den fazla fındık kurdı görülmesi durumunda uygulama yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

SUNIDOX 150 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 22A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlıyan uygulamalarında, direnç gelişimini teşvik etmemektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SUNIDOX 150 SC'nin aynı üretim sezonu içerisinde öne çıkan toplam uygulama sayısını aşmamız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 22A hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Bilinen pek çok fungusit ve insektisitlerle karışabilir. Büyük miktarda karışım yapmadan önce fiziki karışılabilirlik testlerinin yapılması gerekir.

SUNIDOX 150 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

Grubu	22A	Insektisit (Böcek İlacı)
-------	-----	-----------------------------

150 g/l İndoxacarb

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Yutulduğunda ve solunumunda tehlikelidir. Cilde temas halinde hassasiyet yaratabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluması halinde: Temiz havaya çıkartınız. Önemli miktarda maruz kalırsa doktora başvurunuz.

Cilt ile temas: Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız. Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Derinin tahriş olması durumunda veya alerjik reaksiyonlar görüldüğü takdirde doktora başvurunuz. Tekrar gelişenlere önce giysilerinizi yıkayınız.

Göz ile temas: Konazole lens varsa ve çıkarılmamışsa çıkarınız. Gözleri açık tutarak 15-20 dakika kadar yavaş ve dikkatlice suyla yıkayınız. Göz yanması devam ederse, bir uzmanı başvurunuz.

Yutulması halinde: Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Doktor veya zehirleme merkezi tarafından söylenmediği sürece kusturmayınız. Kusturdu bilinci ise: Ağzı suyla çalkalayınız.

ANTİDÖTÜ VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidöte yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114



SUNO

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

KULLANIRKEN VE DEOPLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSULAR:

-Arıları zehirlerdir. Ürünü çiçeklenme zamanında kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

İlacın normal depolama şartlarında muhafaza ve açılmamış orijinal ambalajlarında satılma şartıyla imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler ve hatalı depolama veya hatalı tatbiki ve tavsiyelere uymadaki elastiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

İHRACATÇI FİRMA:

Jadesheen Chemical Co., Ltd.,
901, NO. 299, Tongda road, Jiangyin (214400), P.R.Çin

ÜRETİM TESİSİ:

Nanjing Huazhou Pharmaceutical Co., Ltd.
NO.9, Dongfeng Road, Yixi Town, Gaochun, Nanjing, P.R.China

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adalet Mah. Manas Bly. No:39 Folkart Towers B Kule Kat.31
D:3107AF Bayraklı-İzmir-Türkiye
Tel: 0232.3909205 Fax: 0232.3909101