



İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No. : 07.05.2019/ 11371

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR:

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre
Domates (Sera)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 ml/ 100 l su (larva)	3 gün
Şeftali	Dut kabuklubiti (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	50 ml/ 100 l su (larva)	14 gün
Patlıcan	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 ml/ da su (larva)	3 gün
Biber (sera)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 ml/ 100 l su (larva)	3 gün
Pamuk	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 ml/ 100 l su (larva)	28 gün
Zeytin	Zeytin karakoşnili (<i>Seissefia oleae</i>)	50 ml/ 100 l su (larva)	14 gün
Hıyar (Sera)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 ml/ 100 l su (larva)	3 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdaki karışım depoya ilave edilir. Karşıtırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karşıtırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve artıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

SUNPROX 100 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

Grubu	7C	İnsektisit (Böcek İlacı)
-------	----	-----------------------------

100 g/l Pyriproxyfen

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HiÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ,

İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE
VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/4'ÜNE KADAR TEMİZ SU
KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU
İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Karakteristik bir zehirlenme belirtisi yoktur. Baş ağrısı, yorgunluk ve halsizlik görülebilir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114



Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Net miktarı : 1 litre
Azami perakende satış fiyatı :

İÇİNDEKİLER:

Pyriproxyfen, Solvent naphtha, Calcium dodecylbenzene sulfonate

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İBARELERİ:

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
H302: Yutulması halinde zararlıdır.
H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H315: Cilt tahrişine yol açar.
H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H400: Sucul ortamda çok toksiktir.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
EUH 401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ÖNLEM İFADELERİ:

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçın.
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonunda tutun.
P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
P280 Korumucu eldiven/korumucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P501 İçeriği/kabı bertaraf edin.

SUNPROX 100 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

Grubu	7C	İnsektisif (Böcek ilacı)
-------	----	-----------------------------

100 g/l Pyriproxyfen

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma: Hastayı açık havaya çıkarın, rahat ve sıcak bir yerde tutun. Solunum güçlüğü varsa oksijen verin. Soluk alıp verme düzenli değilse veya durmuşsa suni solunum uygulayın. Derhal bir doktora veya Ulusal Zehir Danışma merkezine ulaşın. (Bkz.P304+340 ve P312)

Deri ile temas: Derhal ürünün bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yeri 15 dakika boyunca akan su ve sabun ile yıkayın ve ardından talk pudrası ve daha sonra E vitamini bakım kremi uygulayın. İlacın bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın. Tüm vücut teması varsa duş alın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın.

Göz ile temas: Derhal gözü ve göz kapaklarının altını akan bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lensleri çıkarın. Derhal tıbbi yardım alın.

Yutma: Bir doktor çağırın veya hemen tıbbi yardım alın. Maruz kalan kişinin hemen ağzını çalkalayın ve 1 veya 2 bardak su veya süt içirin. Hastanın bilinci yerinde ise, yutma üzerinden az bir zaman geçti ise parmak yardımı ile kusmayı sağlayın. Kusma meydana gelirse ağzı tekrar iyice çalkalayın hastanın bilinci yerinde değilse kusturmayın, ağızdan bir şey vermeyin. Ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Bilinen bir antidot yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114



SUNO

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Böcek regülatörü etkisini 20-30 gün korur. Larvalar ve nimflerin gelişimini engeller ve dönem değiştirme sırasında ölürlür. İlaçlama sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. Her türlü aletle püskürtülebilir.

Domates, Hıyar, Biber, Patlıcan tütün beyazsineği: Beyaz sinek ile bulaşık olduğu saptanan seraya köşegenler yönünde girilir. Her adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva-pupa olduğunda kimyasal mücadeleye başlanır

Şeftali dut kabuklubitt: İlaçlamalar birinci ve ikinci döllere karşı uygulanır. İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Zeytin kara koşnili: İlaçlama zamanı aktif larva çıkışına göre belirlenir. 20-25 cm uzunluğundaki sürgünlerde yumurtaların %50 si açıldığında birinci; gerekli görülürse %90'nın açıldığı devrede ise ikinci ilaçlama yapılır.

Pamuk tütün beyazsineği: Beyaz sinek ile bulaşık olduğu saptanan seraya köşegenler yönünde girilir. Her adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva-pupa olduğunda kimyasal mücadeleye başlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

SUNPROX100 EC adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre grubu 7C olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SUNPROX 100 EC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (7C grubu hariçi) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Alkali özellikte olan bitki koruma ürünleri ile karışmaz. Ancak diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması önerilir.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- Bahçklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
- Ürünü serin, kuru ve iyi havalanabilen yerlerde muhafaza ediniz.
- Ürünü kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak saklayınız.
- Boş ürün ambalajlarını atık tasfiyesinin tehlike oluşturmayaacağı bir yerde, yakma yolu ile veya başka bir uygun yöntem ile imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİCİ:

Jadesheen Chemical Co., Ltd.,
901, NO. 299, Tongdu road, Jiangyin (214400), P.R.Çin

ÜRETİM TESİSİ:

Jiangxi Anlida Chemical Co., Ltd.
Jinshawan Industrial Park, Hukou country, Jinjiang, Jiangxi, Çin

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adalet Mah. Manas Blv. No:39 Folkart Towers B Kule Kat.31
D:3107AF Bayraklı-İzmir- Türkiye
Tel: 02323909205 Fax: 02323909101