

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsatname Tarih ve No. :

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arası Süre
Pamuk	Kırmızı örümcek (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	100 ml / da (yumurta, larva, nimf)	-
	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	75 ml / da (larva, nimf)	-
Patlıcan	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml / 100 lt su (yumurta, larva, nimf)	1 gün
Elma	Avrupa kırmızı örümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	50 ml / 100 lt su (yumurta, larva, nimf)	7 gün
Bağ *	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml / 100 lt su (yumurta, larva, nimf)	7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Gerekli ilaç miktarı önce bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılır. İlaçlama aleti yarısına kadar su ile doldurularak içine bu karışım dökülür ve kalan su miktarı dökülerek ilave edilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Pamukta kırmızı örümcek: Tarla kenarı ve içinde yapılan kontrollerde Akdeniz bölgesinde 5 birey/yaprak, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 10 birey/yaprak yoğunluğuna ulaşıldığında kaplama ilaçlama yapılır.

Bağda kırmızı örümcek: Yapılan sayımlarda 5-8 adet canlı birey/yaprak olduğunda ilaçlama yapılır.

Elmada kırmızı örümcek: Mayıs ayından itibaren 100 yaprakta yapılan sayımlarda 8-10 adet canlı birey/yaprak olduğunda ilaçlama yapılır.

Patlıcanda kırmızı örümcek: Rastgele seçilen bölgelerde bitkinin alt ve orta yapraklarında dekar başına 10 yaprakta sayım yapılır. Yaprak başına en az 5 canlı birey bulunduğuunda ilaçlama yapılır.

ARROGANT 50 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (SC)

Grubu	10A	Akarsitil (Kırmızı Örümcek İlacı)
-------	-----	--------------------------------------

50 g/l Hexythiazox

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SİRASINDA HİÇ BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHA YA 7 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/4'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114**



SUNO

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Azami perakende satış fiyatı (KDV'li) :
Net miktarı : 250 ML

İÇİNDEKİLER:
Hexythiazox

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADESİ:

H332 Solunması hâlinde zararlıdır.

ÖNLEM İFADESİ:

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P280 Korumucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P307+P311 Maruz kalınma hâlinde: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P501 İçeriği/kabı bertaraf edin.

EUH401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ARROGANT 50 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (SC)

Grubu	10A	Akarisit (Kırmızı Örümcek İlaç)
-------	-----	------------------------------------

50 g/l Hexythiazox

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Karakteristik bir zehirlenme belirtisi görülmez.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Göz: Temas halinde 15–20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Gilt: Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15–20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Yutma: Yutulması halinde 1 bardak sıvı 1 çorba kaşığı tuz katılarak hazırlanan tuzlu su içirilmek ya da parmakla boğazının gerisine bastırılmak suretiyle hastayı kusturun. Tıbbi yardım sağlayın.

Soluma: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTU:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.



SUNO

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

UYGULAMA ŞEKLİ:

Her türlü püskürtücü ile havadan ve yerden uygulanabilir. Tarla pülverizatörleri ile ilaçlama yapılırken yaprak altlarının da ilaçlanabilmesi için sıra arası memelerin takılması ve kaplama ilaçlama yapılması tavsiye edilir. Meyve ağaçlarında genellikle çiçek taç yapraklarının tamamen dökülmesinden sonra 1. ilaçlama yapılmalı, yoğunluk olduğu taktirde tekrarlanmalıdır. Erginlerde etkisi düşük olduğundan ergin popülasyonu çoğalmadan ilaçlamaya başlanmalıdır. Eğer ergin popülasyonu fazla ise erginlere etkili bir kontakt akarisit ile karıştırılarak uygulanması tavsiye edilir. Kırmızı örümceklerin direnç kazanmalarını önlemek için ARROGANT 50 EC ile yılda iki defadan fazla ilaçlama yapmayınız. Klasik akarlara direnç kazanmış akarlar da etkilidir. Yağmur ile yıkanmaya dayanıklıdır. Etkisi 50-60 gün sürer. Kırmızı örümceklerin larva ve nimfleri ilaçla temas ettiklerinde veya ilaçlanmış bitki yapraklarına dokunduklarında ölürler. Eğer Arrogant 50 EC doğrudan yumurtaların üzerine püskürtülürse yumurtalar açılmaz. İlaçlanmış yaprağa bırakılan yumurtalar da açılmaz. Eğer erginler ilaçla temas etmişlerse, bıraktıkları yumurtalar açılmaz.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

ARROGANT 50 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 10A olarak sınıflandırılmış bir akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerini tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için ARROGANT 50 EC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 10A hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Kuvvetli alkali ilaçlar hariç yaygın akarisit, fungusit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSULAR:

- Temas ve mide yolu ile etkilidir
- Arılara, kuşlara ve balıklara az zehirlidir
- Faydalı böcekleri etkilemez
- Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
- İlacı serin, kuru ve iyi havalanabilen yerlerde muhafaza ediniz.
- İlacı kendi ambalajında ağzı kapalı olarak saklayınız.
- boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

İlaç orijinal ambalajında, ağzı kapalı olarak, serin ve kuru şartlarda muhafaza edildiğinde imal tarihinden itibaren 2 yıl süre ile kullanılır.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. Firma ilacın yanlış kullanımından ve ilacın uygun olmayan şartlarda muhafaza edilmesinden doğacak zararlardan sorumluluk kabul etmez.

İMALATÇI FİRMA:

Jadesheen Chemical Co., Ltd.,
901, NO. 299, Tongdu road, Jiangyin (214400), P.R.Çin

FABRİKA ADRESİ:

Zhejiang Well-done Chemical Co., Ltd.,
Zhejiang Hangzhou Yuhang Tangqi Mountain Chao

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adalet Mah. Manas Blv. No:39 Folkart Towers B Kule Kat.31
D:3107AF Bayraklı-İzmir- Türkiye
Tel: 02323909205 Fax: 02323909101