

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No. : 1

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma dozu ve dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arası Süre
Kavun	Kabakgillerde külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	15 g /100 l su	3 gün
Bağ*	Külleme (<i>Erysiphe necator</i>)	10 g /100 l su	35 gün
Elma	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	15 g /100 l su	14 gün
Turunçgil	Kahverengi leke (<i>Alternaria alternata f.sp.citri</i>)	20 g /100 l su	28 gün
Çeltik	Çeltik yanıklığı (<i>Pyricularia oryzae</i>)	20 g / da	35 gün
Karpuz	Erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria cucumerina</i>)	20 g / da	3 gün
Kayısı	Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (<i>Wilsonomyces carpophylus</i>)	12,5 g /100 l su	14 gün
Biber (Sera)	Patlıcangillerde külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	15 g /100 l su	3 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan yerlerde kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı karışır durumdayken ilağ su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilağ su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarının su kaynaklarına boşaltmayınız.

FEATURE 50 WG

SUDA DAĞILILABİLİR GRANÜL (WG)

Grubu C3,11 Fungisit (Mantar İlacı)

%50 Trifloxystrobin

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFÜS ETMEYİNİZ
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ
İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ,
İÇMEYİNİZ SİGARA İÇMEYİNİZ
DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ
İLAÇLANMIŞ SAHAYA 2 SAAT İNSAN VE HAYVAN
SOKMAYINIZ

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE
YASAKTIR**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri gözlemlenir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114



SUNO

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Net miktarı : 150 gr.
Azami perakende satış fiyatı :

İÇİNDEKİLER:

Trifloxystrobin

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADESİ:

H332 Solunması hâlinde zararlıdır.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

ÖNLEM İFADESİ:

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanınız.
P264 Elleçlemeden sonra ellerinizi bol su ve sabun ile iyice yıkayınız.
P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayınız.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.
P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, kurbani temiz havaya çıkartınız ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutunuz.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HÂLİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartınız. Durulamaya devam ediniz.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HÂLİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız.
P362 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarınız ve yeniden kullanmadan önce yıkayınız.
P501 İçeriği/kabı bertaraf ediniz.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Kabakgillerde külleme (Kavun): İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 0 C'nin üstünde ve orantılı nemde %50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Bağ külleme: 1. uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde 2. uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuğunun olduğu dönemde 3. uygulama: Çiçek taç yapraklarının döktüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde 4.ve diğer uygulama: üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Elma karalekesi: 1. uygulama:Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce) 2. uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde) 3. uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 döktülünce, Diğer ilaçlamalar bitki koruma ürününün etki süresi, hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı): 1. uygulama: sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2. uygulama: ilkbaharda çiçek tomurcuqları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde) 3. ilaçlama: meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

Patlıcangillerde Külleme (Biber (sera)): Uygulamalar serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır.

Turunçgillerde kahverengi leke: Uygulamaları sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacı ile 11-20 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyveler yaklaşık 4cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Çeltik yanıklığı: Yeşil aksam uygulamasında hastalık belirtileri bölgede görülür görülmez veya hava koşulları hastalık gelişmesine uygun şekilde gidiyorsa, hemen uygulamaya başlanmalıdır. Gerekirse ürünün etki mekanizması ve hava koşullarına bağlı olarak ikinci veya üçüncü uygulama yapılmalıdır.

Karpuz alternarya yaprak yanıklığı: Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddet, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

FEATURE 50 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 11, C3 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için FEATURE 50 WG'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmamız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 11, C3 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Tereddüt halinde uygulamadan önce bir karışılabilirlik testi uygulanmalıdır. Şayet Feature 50 WG diğer ilaçlar ile tank karışımı halinde kullanılacak ise aletin su bulunan deposuna önce Feature 50 WG sonra ayrı bir kapta su ile karıştırılmış diğer ilaçlar konmalıdır. Şayet karışım girer ilaçlar & #39;suda erir ambalajda (WSB) ise & #39; depoya önce bunlar sonra Feature 50 WG ilave edilmelidir. Yavıcı, yapıştırıcı ile karıştırmayın. Bağda, Chropyrifos-ethyl ve Cypermethrin terkipli ilaçlarla yapılan karışımlar Yalova İncisi, Kardinal, Müşküle ve Perlet gibi hassas çeşitlerde genç yapraklarda hafif yakma yapabilir.

FEATURE 50 WG

SUDA DAĞILILIR GRANÜL (WG)

Grubu	C3,11	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	-------	----------------------------

%50 Trifloxystrobin

İLK YARDIM ÖNEMLERİ:

Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

Cilt: Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

Yutma: Hastayı ve ilaç ambalajını derhal doktora gösteriniz. Bilinci kapalı hastaya ağzından hiçbir şey vermeyin ve kusturmaya çalışmayın.

Soluma: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Nefes almakta güçlük çekiyorsa suni teneffüs yaptırılır. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114



Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSULAR:

-Kalan ilaç mahlulünü kuyu, havuz, çeşme yatakları ve akarsulara dökmeyiniz.
-Bahçlara zehirlidir, sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
-Arlara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
-Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız.
-Usulüne uygun olarak imha ediniz.
Yeni ilaçların sahada hayvan otlatılmamalı ve evcil hayvanlar buralardan uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ilacının kalitesini garanti ederler. Firma ilacın yanlış kullanımdan ve ilacın uygun olmayan şartlarda muhafaza edilmesinden doğacak zararlardan sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

Jadesheen Chemical Co., Ltd.,
901, NO. 299, Tongdu road, Jiangyin (214400), P.R.Çin

ÜRETİM TESİSİ:

Shaanxi TPS Biotechnology Co.,Ltd f
15F, Block C, Jinqiao International Plaza, Xi'an Hi-tech Industries Development Zone, Shaanxi Province, Çin

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adalet Mah. Manas Blv. No:39 Folkart Towers B Kule Kat.31
D:3107AF Bayraklı-İzmir Türkiye
Tel: 02323909205 Fax: 02323909101