

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Serj No:
Ruhsat Tarih ve No. : 10974 / 06.11.2017

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Kullanım Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arası Süre
Şekerpancarı	Pancar Yaprak Leke Hastalığı (<i>Cercospora beticola</i>)	50 ml / da	35 gün
Buğday	Pas (<i>Puccinia spp.</i>)	100 ml / da	35 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Respond125 SC önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

RESPOND 125 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

Grubu	3	Fungisit (Manfar ilacı)
-------	---	----------------------------

125 g/l Flutriafol

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/4'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Ağız dolusundan daha az miktarlarda yutulduğunda mide bulantısı, kusma ishal gibi gastrointestinal rahatsızlıklara, yüksek dozlarda yutulduğunda tansiyonun düşmesine, deriden emilimi ya da solunum maruziyeti sonucu toksik dozun miktarına göre baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, halsizlik, tansiyon düşmesine akciğer ödemeine neden olabilir.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114**



SUNO

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Net miktarı : 1 litre
Azami perakende satış fiyatı :

İÇİNDEKİLER:

Flutriafol içerir.

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İBARELERİ:

H302 Yutulması hâlinde zararlıdır.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H411 Sıcak ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P261 P261Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni solumaktan kaçının.
P280 Koryucu eldiven/koryucu kıyafet/göz koryucu/yüz koryucu kullanın.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HÂLİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P501 İçeriği/kabı bertaraf edin.
EUH401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Hastalıklara karşı başarılı bir mücadele yapabilmek ve iyi bir ürün verimi elde edebilmek ilk hastalık enfeksiyonlarının başladığı zaman mücadelenin yapılması ile mümkündür.

Şekerpancarı Pancar yaprak leke hastalığı: Hastalık bitkilerin %1'inde görüldüğünde hemen uygulama yapılmalıdır. Hastalık tekrar görüldüğünde uygulama tekrarlanır.

Hububatı pas hastalıklarına karşı: Uygulama pas püstüllerinin ilk görülmeye başladığı zamanda yapılmalıdır. Uygulama aleti olarak kullanılan tarla pülverizatörleri en az 2.1 bar basınçla çalıştırılmalı ve dekara en az 25 litre su atılmalıdır.

Elma Kara leke hastalığı: 1.Uygulama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerde 3-5 gün önce), 2. uygulama pembe rozet tomurcuğu döneminde çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde, 3. uygulama çiçek taç yapraklarının % 70-80'i dökülünce, 4. ve diğer uygulamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda ve hastalığın seyrine göre devam edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

RESPOND (Flutriafol) adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre grubu 3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için RESPOND'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (3 grubu hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

RESPOND125 SC: Lambda-cyhalothrin,Primicarb, Captan, Maneb, Mancozeb ile karışabilir

RESPOND 125 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

Grubu	3	Fungisit (Manlar İlacı)
-------	---	----------------------------

125 g/l Flutriafol

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Hastayı sıcak tutarak doktora göndirin. İlaç ve etiketini birlikte götürünüz.

Solunum: ; Hafif durumlarda temiz havaya çıkarmı belirtiler görülürse tıbbi yardım alın. Personeli temiz havaya çıkarınız. Ciddi durumlarda hemen doktorla temasa geçin ve ambulans çağırın.

Deri ile temas: Cildi derhal bol su ve sabunla yıkayın. Kirlenmiş giysileri çıkartın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın. Tahriş olursa tıbbi yardım alın.

Göz ile temas: Gözleri derhal bol su ya da göz yıkama çözümü ile göz kapakları açık bir şekilde kimyasal madde tamamen arınmaya kadar yıkayın; varsa kontak lensleri çıkartın, yıkamaya bir süre daha devam edin. Tercihen bir göz doktorundan gecikmeden yardım alın.

Yutma: Ağzı yoluyla hiçbir şey vermeyin. Ağzı su ya da süt ile çalkalayın. Kusturmayın, kusmasına izin vermeyin. Eğer kusarsa ağız tekrar su veya süt ile çalkalatsın. Hemen doktor çağırın ve/veya acil yardıma sevk edin. Kusturma kararı doktor tarafından alınmalıdır.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Bilinen özel bir antidotu yoktur. Aktif kömür ile gastrik lavaj düşünülebilir. Hastada gözlenen belirtiler değerlendirilerek uygun tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114



SUNO

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

KULLANIRKEN VE DEOPLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSULAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına buluşturmayınız.
- Kuşlar, toprak mikro ve makro organizmaları için zararlı olarak kabul edilmez.
- Hazırlanan ilaç hemen kullanılmalıdır
- Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla ilaçlı mahlül hazırlamayınız.
- Hazırlanan ilacın direk güneş ışığından korunması gerekir.
- İlacın kullanma ve içme sularına karışmasına mani olunuz.
- Kullandıktan sonra boş ambalajları imha ediniz. Başka maksatlarla kullanmayınız.
- İlacı orijinal ambalajında kapalı olarak, ateşten uzakta, serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma ürünlerin kalitesini garanti eder; fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, uygulama hataları, tavsiyeye uymadaki eksiklikler ve depolamadaki hatalardan dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu değildir.

İMALATÇI FİRMA:

Jadesheen Chemical Co., Ltd.,
901, NO. 299, Tongdu road, Jiangyin (214400), P.R.Çin

FABRİKA ADRESİ:

Jiangsu Sevencontinent Green Chemical Co.,Ltd
North Area of Dongsha Chem-Zone, Zhangjiagang,
Jiangsu Çin

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adalet Mah. Manas Blv. No:39 Folkart Towers B Kule Kat.31
D:3107AF Bayraklı-İzmir- Türkiye
Tel: 02323909205 Fax: 02323909101