

Garanti Edilen İçerik

Toplam Azot (N)
Organik Madde

%W/W

%6

%40

KULLANIM DOZLARI

Bitkiler	Uygulama Dönemi	Yapraktan Uygulama	Topraktan Uygulama
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Kavun, Karpuz vb.	Şaşırtmadan itibaren 10 gün ara ile	150 - 300 cc / da	1- 1,5 lt / da
Patates, Soğan, Lahana, Havuç, Şeker Pancarı vb.	İlk çapadan sonra gelişme dönemi boyunca	150 - 300 cc / da	1- 1,5 lt / da
Pamuk, Mısır, Soya, Ayçiçeği vb.	Aktif gelişme döneminde	100 - 200 cc / 100 lt su	0,5 - 1 lt / da
Hububat	Kardeşlenmeden itibaren	100 - 200 cc / 100 lt su	0,5 - 1 lt / da
Muz	Aktif gelişme döneminde	200 - 500 cc / da	1- 2 lt / da
Narenciye Meyve Ağaçları, Zeytin Ağacı	Aktif gelişme döneminde	200 - 500 cc / da	1-2 lt / da
Bağ	Aktif gelişme döneminde	200 - 500 cc / da	1-2 lt / da

Tüm bitkilere; Damlama sistemi ve yağmurlama uygulaması ile toprağa 2-3 lt/da dozda kullanılabilir. Yaprak uygulaması ile 100 lt suya 200 - 500 ml dozda kullanılması önerilir. Kullanım dozları toprak/yaprak analizleri sonucuna göre bitki ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenmelidir. Aynı şekilde uygulamanın tekrarlanması analiz sonuçları ve bitkinin toplam ihtiyaçları göz önüne alınarak bir program dahilinde yapılmalıdır.